



Consignes postopératoires ENDO (traitement de canal)

Prenez des antidouleurs (Advil 400mg ou Tylenol 1000mg) **avant** que l'anesthésie ne soit complètement disparue.

Il est normal de ressentir de la sensibilité pendant une ou deux journées suite au traitement et ce, même si la dent n'était pas sensible avant de faire le traitement. Pour votre confort, prenez vos antidouleurs de manière régulière.

Le traitement de canal élimine les bactéries dans les racines de vos dents. Par contre, il y a aussi des bactéries à l'extérieur des racines et au bout de la dent dans l'os. Normalement, le corps va les éliminer suite au traitement de canal. Dans environ 5% des cas, vous aurez besoin de prendre un antibiotique pour aider à la guérison. Si au bout de 3 jours vous ressentez une enflure, des élancements ou une douleur continue, ce que vous n'aviez pas la première journée après le traitement de canal, veuillez téléphoner à la clinique.

Si votre traitement de canal a été complété en une seule visite, l'accès de votre dent est rempli par du composite (plombage blanc). Votre dent a aussi été limée pour qu'elle ne soit pas trop haute.

Si votre traitement de canal sera complété en deux visites, une obturation temporaire a été placée. Cette obturation est blanche et peut se creuser un peu d'ici votre prochain rendez-vous. Suite au rendez-vous, il faut attendre 2 heures pour manger dessus, afin de laisser l'obturation durcir complètement. Si vous ne voyez plus le blanc dans votre dent et sentez un gros trou, contactez-nous.

Un mois après le traitement, il est recommandé pour toutes les molaires ainsi que certaines autres dents qui sont très détruites de faire un pivot et une couronne pour éviter la fracture de la dent. Demandez à votre dentiste si c'est le cas pour votre dent.

Pour toute question, inquiétude ou urgence, n'hésitez pas à nous contacter
Contact d'urgence:
(438) 969-9960 poste 8.